



Montevideo, 24 de mayo de 2023

## Informe n°08/2023

### Perspectivas de precipitación para las cuencas de Santa Lucía y del Río de la Plata a corto y mediano plazo

(Próximo actualización del informe, tarde del jueves 25 de mayo de 2023).

#### 1. Diagnóstico climático

En el mes de **abril** las precipitaciones más importantes se registraron sobre el litoral norte, básicamente sobre los departamentos de Salto y Paysandú, con otro extremo en el sur del país, puntualmente Montevideo.

El valor acumulado mensual más elevado se registró en la estación meteorológica de Salto con 114.9 mm, estando por debajo de su climatología de 158.0 mm para el mes (período de referencia 1981-2010). La posición de abril de 2023 en relación los últimos 43 años, lo posiciona en el 4to lugar, ordenado según los menos lluviosos de la serie, con 43.0 mm de promedio nacional, muy por debajo de la media esperada para el mes (130.3 mm).

El rango de las precipitaciones se ubicó entre los 114.9 mm en la estación meteorológica de Salto y los 6.2 mm en la estación meteorológica de Artigas; y los eventos de precipitación, en cuanto a los acumulados más elevados en promedio a escala país, ocurrieron los días 12, 25 y 30 de abril.

En lo que respecta al comportamiento de las anomalías, vuelven a registrarse anomalías negativas en todo el territorio nacional, siendo más elevadas en la frontera norte y la franja central (de oeste a este).

Evaluando el último trimestre (Febrero-Marzo-Abril), se mantiene el déficit hídrico en la región del sur y suroeste del país, puntualmente sobre los departamentos de Colonia, San José, Canelones y Montevideo.

#### Cuenca de Santa Lucía y del Río de la Plata

Continúan las anomalías negativas, que se iniciaron al menos en el mes de febrero de 2022. Siendo el último mes con anomalías positivas, el pasado enero de 2022.




Figura 1 - Precipitación acumulada (izq) y anomalía mensual (der) de abril 2023

En la figura 2, identificamos una mayor concentración de acumulados mensuales por debajo de los 40.0 mm, apreciándose que los acumulados más bajos fueron concentrados al sur de la cuenca del Río Negro y la zona central de la cuenca de la Laguna Merín.

Si bien en el mapa figuran valores iguales y/o superiores a los 100 mm, estos sólo se registraron en 3 estaciones, Salto y Quebracho (Paysandú) ubicadas dentro de la cuenca del Río Uruguay, y en la estación meteorológica del Prado (Montevideo); esta última ubicada dentro de la cuenca del Río de la Plata.




Figura 2 - Distribución espacial de los acumulados de precipitación del mes de abril en forma discreta, dentro de las cuencas hidrográficas de nivel 1.



En los siguientes mapas se identifica el estado en porcentaje de agua disponible en los suelos. Sobre ambas cuencas de interés, en los primeros 10 días de mayo los valores se ubicaban entre 20/30 % al oeste de la cuenca del Río de la Plata mientras que en el resto de ambas cuencas, el valor está por debajo del 20% (mapa de la izquierda).

Entre el 11 y 20 de mayo (mapa de la derecha), al no generarse precipitaciones significativas, se aprecia un empeoramiento de la situación hídrica de los suelos en ambas cuencas, con valores inferiores al 20 %.

Esto indica que las futuras lluvias en primera instancia, recargarán los suelos y luego podrían generar la escorrentía superficial y aumentar el caudal del Santa Lucía y del Río de la Plata.




Figura 3 - Porcentaje de agua disponible en el suelo (%) al 10 de mayo (izq) y al 20 de mayo de 2023 (der).

Con lo observado en los primeros 23 días del mes en relación al acumulado de precipitaciones, se destaca que, a pesar de las lluvias ocurridas, continua el déficit hídrico en el centro-sur del país, y que ha mejorado la situación en la frontera noreste. En esta última zona, los acumulados ya alcanzaron valores normales para el mes, reflejado esto en un 100% de agua disponible en los suelos sobre Cerro Largo, Rivera y este de Treinta y Tres.

En los siguientes figuras se presentan mediante símbolos proporcionales los acumulados de las precipitaciones desde el 1 al 23 de mayo, por estación pluviométrica y/o meteorológica ubicadas dentro de la cuenca del Santa Lucía (figura 4) y de la cuenca del Río de la Plata (figura 5).





En ambos casos, los acumulados están muy por debajo de la climatología (1991-2020), principalmente en la cuenca de Santa Lucía, donde el actual promedio de acumulados alcanzó los 16 mm (valores extremos máximos en Mal Abrigo con 49 mm y mínimos de 3.8/4.0 mm en San Gabriel/Casupá, respectivamente), siendo este valor promedio inferior al 20% de lo normal para los primeros 23 días del mes en curso.




Figura 4 - Acumulados de precipitación del 1 al 23 de mayo en la cuenca del Santa Lucía.



Figura 5 - Acumulados de precipitación del 1 al 23 de mayo en la cuenca del Río de la Plata.






**Acumulados de precipitación en las últimas horas.**

Desde las 00 hs y hasta las 16 hs de hoy, miércoles 24 de mayo; el acumulado registrado en nuestra red telepluviométrica (incluyendo datos de los sensores de Salto Grande instalados en el Noroeste del país), alcanzó valores máximos promedio en el Suroeste y Oeste (de 10 a 30 mm) con extremos que oscilaron entre los 40-62 mm en Paysandú, Río Negro y Soriano.


En la cuenca del Santa Lucía, los valores oscilaron entre 5-10 mm, principalmente sobre las represas de Paso Severino y Aguas Corrientes.

En relación a la cuenca del Río de la Plata, en el oeste, los acumulados oscilaron (al momento) entre 10-15 mm; mientras que en el este de la misma, los acumulados fueron inferiores a los 5 mm.



Nombre	Precip. Acum.
Mercedes G3	62.6 mm
Nuevo Berlín	56.7 mm
Parador La Vibora	49.1 mm
Queguay Ruta 3	47.0 mm
Quebracho	41.2 mm
Paysandú G3	33.6 mm
Piedras Coloradas	30.3 mm
Young G3	27.1 mm
El Eucaliptus	24.8 mm
Guichon	24.2 mm
San Javier	23.7 mm
Palmitas	21.6 mm
El Tala	21.4 mm
El Águila	20.6 mm
Dolores	19.6 mm

**Figura 6 - Mapa de acumulados de precipitación mediante telepluviometría (izq) y valores máximos (der) entre las 00 hs y las 16 hs de hoy 24 de mayo Datos INUMET.**



## 2. Pronóstico de precipitación para los siguientes 14 días

### - Cuenca de Santa Lucía

Algunos miembros de los modelos numéricos (deterministas y ensambles) utilizados, mantienen desde la pasada semana una alta confianza (> 90%) en la ocurrencia de precipitaciones entre el miércoles 24 y viernes 26; previéndose un **promedio de precipitaciones acumulado entre 20-50 mm sobre la cuenca**, con valores puntualmente superiores en distintas localidades dentro de la misma (figura 7).

Luego del evento antes mencionado y en relación al pronóstico extendido hasta el 07 de junio, se prevé un período seco, donde no se proyectan (de momento) eventos de precipitaciones significativos para la cuenca.





Figura 7 - Pronóstico del promedio de lluvias acumuladas para la cuenca de Santa Lucía entre el 24 y 30 de mayo de 2023. Ensamble NEMS+GFS.

### - Cuenca del Río de la Plata

Algunos miembros de los modelos numéricos (deterministas y ensambles) utilizados, mantienen desde la pasada semana una alta probabilidad (> 90%) en la ocurrencia de precipitaciones entre el miércoles 24 y viernes 26, incluso incrementando el valor acumulado en sus actualizaciones diarias.

Previéndose un **promedio de precipitaciones acumulado entre 40-70 mm** para el **Oeste de la cuenca** con valores puntualmente superiores en distintas localidades (figura 8).

Mientras, se prevé un **promedio de precipitaciones acumulado entre 20-40 mm** sobre el **Este de la cuenca** con valores puntualmente superiores en distintas localidades (figura 9).



Luego del evento antes mencionado y en relación al pronóstico extendido hasta el 07 de junio, se prevé un período seco, donde no se proyectan (de momento) eventos de precipitaciones significativos para la cuenca del Río de la Plata.




Figura 8 - Pronóstico del promedio de lluvias acumuladas para el Oeste de la cuenca del Río de la Plata entre el 24 y 30 de mayo de 2023. Ensemble NEMS+GFS.




Figura 9 - Pronóstico del promedio de lluvias acumuladas para el Este de la cuenca del Río de la Plata entre el 24 y 30 de mayo de 2023. Ensemble NEMS+GFS.

### 3. Pronóstico climático mensual

Un conjunto de siete modelos climáticos (en su ensamble) indican anomalías de precipitación (figura 10, columna derecha) un ligero sesgo negativo (déficit) sobre litoral oeste y sur de Uruguay para mayo 2023; mientras que para junio, no se indican sesgos significativos sobre todo el Uruguay. En julio no se identifican sesgos sobre Uruguay; aunque sí sobre la cuenca alta del Río Uruguay (en territorio brasileño), donde se observan sesgos positivos (excedente) en las precipitaciones.

En relación a la temperatura (figura 10 - columna izquierda), los sesgos son claramente y sistemáticamente positivos en los tres meses del periodo Mayo-Junio-Julio.






Figura 10 - Pronóstico climático mensual de anomalías de temperatura (izq) y de precipitación (der).

#### 4. Pronóstico climático estacional de precipitación (elaborado por INUMET-UDELAR)

En relación a la precipitación en la totalidad del trimestre Mayo-Junio-Julio (figura 11), elaborado por el Grupo de Tendencias Climáticas (Inumet-Udelar); se indica un ligero sesgo negativo sobre noreste de Uruguay, mientras que en el resto del país, tiende a condiciones climatológicas, lo que



significa que no se dispone de un señal clara hacia sesgos negativos o positivos. Este producto se actualiza mensualmente, siendo publicado el próximo boletín a inicios de junio 2023.




Figura 11 - Pronóstico climático estacional de precipitación May-Jun-Jul 2023 (INUMET-UDELAR) .

Dirección  
Área de Meteorología y Clima para la Sociedad  
Instituto Uruguayo de Meteorología

*Informe elaborado por el INUMET, único de carácter oficial en la  
República Oriental del Uruguay (Artículo 4° de la Ley 19.158).*



#### **4. Referencia**

- Mapas y gráficos elaborados por INUMET.
- Mapas y gráficos elaborados por Meteoblue.
- Modelos deterministas utilizados: WRF, COSMO, GFS y del ECMWF.
- Modelos ensambles utilizados: NEMS, GFS y del ECMWF.
- Grupo Tendencias Climáticas Trimestrales (INUMET-UDELAR).
- Datos de pluviometría y telepluviometría de INUMET
- Datos de telepluviometría de la Comisión Mixta de Salto Grande