



Montevideo, 21 de agosto de 2023

Informe n°24/2023

Perspectivas de precipitación para las cuencas de Santa Lucía y del Río de la Plata a corto y mediano plazo

(Próxima actualización del informe, martes 29 de agosto de 2023).

1. Diagnóstico climático

En el mes de **julio** las precipitaciones más importantes se registraron sobre el noreste del país básicamente sobre los departamentos de Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó y la región este de Salto. El rango de las precipitaciones se ubicó entre los 243,5 mm en la localidad de Vichadero (Rivera) y los 48,3 mm en la estación meteorológica de Laguna del Sauce (Maldonado).


Los eventos de precipitaciones más destacados del mes ocurrieron los días 6, 12 y 24 de julio.

A escala país y en términos medios, julio del 2023 culminó con 100,7 mm; valor que se ubica por encima de la normal climatológica esperada para este mes (83,6 mm). En cuanto a la cantidad de días también estuvo por encima de la climatología con 7 días, siendo la media de 6 días, según el período de referencia 1981-2010.

En lo que respecta al comportamiento de las anomalías de precipitación, fueron positivas al Norte y Noreste del país, esto se explica por los acumulados mensuales en varias localidades de esta región por encima de los 200,0 mm, superando la climatología.

Por otra parte, al sur del país continua el déficit de precipitación, básicamente sobre los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Lavalleja, Rocha, Florida y Durazno. Algunas regiones de los departamentos de Colonia y San José también continúan registrando precipitaciones deficitarias de forma sostenida así como el Noreste de Artigas. El rango de las anomalías estuvo entre los 178,2 % en Valle Edén (Tacuarembó) y los -42,4 % en la estación meteorológica de Carrasco (Canelones).

Evaluando el último año y el último trimestre (Mayo-Junio-Julio), se mantiene el déficit hídrico en el país, principalmente en la región del centro-sur, suroeste y este.



Cuenca de Santa Lucía y del Río de la Plata

Continúan las anomalías negativas, que se iniciaron al menos en el mes de febrero de 2022. Siendo el último mes con anomalías positivas, el pasado enero de 2022.




Figura 1 - Precipitación acumulada (izq) y anomalía mensual (der) de julio 2023

En los siguientes mapas (figura 2) se identifica el estado en porcentaje de agua disponible en los suelos en períodos acumulados de 10 días.

En el último período (1 al 10 de agosto – abajo der.) en relación al anterior (21 al 31 de julio - izq.), debido a la falta de precipitaciones, hubo una mayor pérdida de humedad en los suelos en todo el país, acentuándose sobre el litoral oeste y extremo sur.





Figura 2 - Porcentaje de agua disponible en el suelo (%) 21 al 31/7 (izq) y del 1 al 10/8 (der)



Cabe destacar, que las futuras lluvias importantes en primera instancia, recargarán los suelos y luego podrían generar la escorrentía superficial y aumentar el caudal del Santa Lucía y del Río de la Plata.

2. Diagnóstico de julio y agosto

En las siguientes figuras se presentan mediante símbolos proporcionales, los acumulados de las precipitaciones desde el **1 al 31 de julio**, por estación pluviométrica y/o meteorológica ubicadas dentro de la cuenca del Santa Lucía (figura 3) y de la cuenca del Río de la Plata (figura 4).

Durante este período se registró un **promedio de 92,0 mm** en la **cuenca de Santa Lucía**, con valores puntuales sobre la represa de Paso Severino de 80,8 mm y 80,2 mm en Santa Lucía (próximo a la represa de Aguas Corrientes).




Figura 3 - Acumulados de precipitación del 1 al 31 de julio en la cuenca del Santa Lucía.



Figura 4 - Acumulados de precipitación del 1 al 31 de julio en la cuenca del Río de la Plata.

Durante los primeros 20 días del corriente mes, el acumulado promedio de la cuenca del Santa Lucía alcanzaron 92,8 mm, siendo este valor el 100% de lo normal para este período, utilizando como referencia la climatología de 1981-2010. Acumulado de Paso Severino 81,6 mm y Santa Lucía 84,8 mm.

3. Pronóstico de precipitación para los siguientes 14 días

- Cuenca de Santa Lucía

Algunos miembros de los modelos numéricos (deterministas y ensambles) utilizados, mantienen la probabilidad alta (> 75 %) de la ocurrencia de un evento de lluvia entre la noche del **lunes 21 y durante el martes 22 con valores entre 20-40 mm y puntualmente superiores.**

- Cuenca del Río de la Plata

Algunos miembros de los modelos numéricos (deterministas y ensambles) utilizados, mantienen la probabilidad alta (> 75 %) de la ocurrencia de un evento de lluvia entre la noche del **lunes 21 y durante el martes 22 con valores entre 20-40 mm y puntualmente superiores al Este de la cuenca, mientras que al Oeste de la misma se prevé entre 15-30 mm.**



En relación al pronóstico extendido hasta el 3 de setiembre para ambas cuencas, se prevé el pasaje de un frente frío hacia el 31 de agosto, situación que se analizará en la próxima actualización del informe.

4. Pronóstico climático mensual

Un conjunto de siete modelos climáticos (en su ensamble) indican anomalías de precipitación y temperaturas para el trimestre.

En la figura 5 (columna derecha), se aprecia ligeros sesgos positivos sobre el extremo Noreste y Este de Uruguay en agosto; extendiéndose hacia el centro de Uruguay en setiembre y cubriendo todo el territorio en octubre.

En relación a la temperatura (figura 5 - columna izquierda), los sesgos son claramente y sistemáticamente positivos en el trimestre agosto, setiembre y octubre.




Figura 5 - Pronóstico climático mensual de anomalías de temperatura (izq) y de precipitación (der).



4. Pronóstico climático estacional de precipitación (elaborado por INUMET-UDELAR)

En relación a la precipitación en la totalidad del trimestre Agosto-Setiembre-October (figura 6), el pronóstico trimestral elaborado por el Grupo de Tendencias Climáticas (Inumet-Udelar); divide el país en dos regiones. En el noreste, este y sureste el sesgo es superior a lo normal (tercil superior-central-inferior 45%-30%-25%); mientras que en el resto del país se prevén condiciones climatológicas, lo que significa que no se dispone de un señal clara hacia sesgos negativos o positivos.

Este producto se actualiza mensualmente, siendo publicado el próximo boletín a inicios de setiembre 2023.




Figura 6 - Pronóstico climático estacional , probabilidades de terciles de precipitación para Ago-Set-Oct 2023 (INUMET-UDELAR).

Dirección

Área de Meteorología y Clima para la Sociedad
Instituto Uruguayo de Meteorología

*Informe elaborado por el INUMET, único de carácter oficial en la
República Oriental del Uruguay (Artículo 4° de la Ley 19.158)*

